

### **Jak się przygotować do posiewu kału?**

Należy zaopatrzyć się w standardowy pojemnik do badania kału lub w specjalną próbkówkę z podłożem transportowym, która dostępna jest w punkcie pobrań w Przychodni.

#### **W dniu badania**

Przed pobraniem materiału należy całkowicie opróżnić pęcherz. Kał należy oddać do wyparzonego i wysuszonego pojemnika lub na czysty papier toaletowy. Następnie należy pobrać jałową wymazówką wymaz z kału poprzez włożenie do niego wacika/wymazówki, obrócenie go w kale, a następnie umieszczenie go w podłożu transportowym.

W przypadku badania w kierunku rotawirusów, adenowirusów, a także *Clostridium difficile* należy pobrać szpatułką porcję kału (wielkości orzecha laskowego lub w przypadku płynnego kału ok. 1-2ml).

Materiał powinien być pobrany z kilku miejsc ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zawierających np. krew, ropę lub śluz.

Pobrany materiał opisany imieniem, nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania należy dostarczyć do laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.00.

#### **UWAGA!**

W przypadku wykonywania różnych badań kału, próbki materiału należy dostarczyć w oddzielnych pojemnikach.

Próbki do badania powinny być pobrane przed rozpoczęciem leczenia przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego.

W przypadku leczenia przeciwbakteryjnego badanie kontrolne należy wykonać najwcześniej 5 dni po jego zakończeniu.

Kobiety mogą wykonać badanie co najmniej 3 dni po zakończonej miesiączce.

**Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami pod numerem 666 079 426 lub 666 079 433.**